

Versio: 3  
Päivämäärä: 28.6.2024  
Hyväksyjä: Sari Hämäläinen, 18.6.2024 15:14

28.8.2023

Yksikkö:	<b>142021 Infektio- ja sairaalahygieniaksikkö</b>	Hoito- ja tutkimusohje	Julkinen
----------	---	------------------------	----------

Otsikko:	<b>Difteriaepäily -lyhyt toimintaohje</b>
Laatija(t):	Vänttinen, Markku
Vastuuhlö:	Vänttinen, Markku
Hyväksyjä:	Hämäläinen Sari
Kuvaus:	Toimenpiteet, joita kurkkumätäepäily edellyttää

## KURKKUMÄTÄEPÄILY

Kurkkumätää tulisi Suomessa epäillä, kun rokottamattomalla tai puutteellisesti rokotetulla lapsella tai aikuisella todetaan rajuoireinen/poikkeava nielutulehdus etenkin, mikäli samalla todetaan kaulan alueen turvotus. Epäilyä vahvistaa edeltävä (10 vrk) matkustus korkean riskin alueelle (Itä-Eurooppa, Afrikka, Lähi-itä, Etelä- ja Kaakkois-Aasia, Etelä-Amerikka) tai lähikontakti kyseisillä alueilla oleskelleeseen henkilöön. Kurkkumätä on yleisvaarallinen tartuntatauti, mikä mahdollistaa myös tahdosta riippumattomat eristämistoimet (tartuntatautilääkärin tekemä hallintopäätös).

Kurkkumätäbakteeri voi aiheuttaa lieväoireisen streptokokkiangiinaa muistuttavan nielutulehduksen myös asianmukaisesti rokotetulle henkilölle.

## EPÄILTY TAI VARMISTETTU KURKKUMÄTÄPOTILAS

- [pisara-](#) ja [kosketusvarotoimet](#), yhden hengen huone
- konsultoi korva- ja infektiolääkärinä
- ota differiaviljely nielusta (1254 CodiVi ja 1826 CodiNhO)
- näytteenotto-ohje Islabin ohjekirjasta näytteenotto-ohje:  
<http://webohjekirja.mylabservices.fi/ISLAB/index.php?test=1254>)
- ota verinäyte vasta-ainemääritystä varten (1253 S -CodiAb)
- ohje antibioottien ja antitoksiinin käytöstä ja annostelusta löytyy THL:n ohjeessa (linkki alla)

Versio: 3  
Päivämäärä: 28.6.2024  
Hyväksyjä: Sari Hämäläinen, 18.6.2024 15:14

## ETSI LÄHIKOHTAKTIT

- kartoita alustavasti lähikontaktit 10vrk ajalta ennen oireiden puhkeamista
- tarkempi tartunnan jäljitys tehdään pääsääntöisesti virka-aikana
- ota yhteys terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin ja päivystysaikana terveyskeskuspäivystäjään
- lähikontaktit ohjataan näytteenottoon ja heille aloitetaan antibioottiprofylaksi
- lähikontaktien rokotustilanne selvitetään ja lähikontakteille annetaan yksi tehosteannos difteriatoksoidia sisältävää rokotetta, ellei henkilö ole jo saanut aiemmin täyden perussarjan ja viimeisimmästä difteriarokotuksesta on alle 12 kuukautta aikaa.
- lähikontakteja ohjeistetaan seuraamaan kurkkumätään viittaavien oireiden ilmenemistä
- lähikontaktit ohjeistetaan välttämään kontakteja, kunnes näytevastaukset ovat valmistuneet ja antibioottihoidon aloituksesta on kulunut yli 2vrk, riskityössä pidempään (ks. THL:n toimenpideohje)

[THL:n toimenpideohje torjuntatoimista kurkkumätätapausten yhteydessä](#)